

luei

~~1788~~

par Marrigue

n° 15.

Observations

Sur la Gangrenne *relativement*
à l'usage du Quinquina

Dans l'observation que j'ai envoyée à l'Académie le 27 septembre dernier, sur une gangrenne au gros orteil, que j'ai regardée ^{comme} provenant d'une cause interne; j'ai attribué la guérison radicale du malade, à l'usage intérieur et extérieur du quinquina, et à celui du camphre appliqué extérieurement. Quelques faits de chirurgie que ma pratique m'a fournis, sur le même objet des gangrenes, m'ont fait remarquer que le Quinquina pourroit bien n'être pas applicable dans tous les genres de gangrenes: et qu'on pourroit en restreindre l'usage dans quelques cas seulement, et cela relativement aux causes qui produisent cette fâcheuse maladie, car la pratique en offre qui peuvent guérir sans ce remède.

J'ai déjà eu le dessein de traiter cette matière dans un mémoire étendu: mais j'ai persuadé qu'on ne peut

ARCH 1092



a
établir de préceptes sur l'usage d'un remède que d'après
un grand nombre de faits: et ayant en propre
peu d'observations à employer à cet objet: j'ai préféré
de présenter mes observations, dans un état isolé, à
l'academie Royale de Chirurgie, lui laissant la
liberté de s'en servir l'orsqu'il lui plaira, traiter
ce sujet dans quelques uns de ses Mémoires.

Je dirai pourtant que mes observations tendent à
prouver, que l'usage du quinquina, pris intérieurement
et appliqué extérieurement, convient seulement dans
les gangrenes de cause interne: mais que dans
celles qui n'ont qu'un vice local, ce remède est
absolument inutile.

L'observation suivante peut aller de suite avec celle
que j'ai envoyée à l'academie, c'est le succès de la cure
qui en fait l'objet, qui m'a déterminé à me servir
du quinquina, dans le fait de pratique que j'ai
communiqué.

I Observation

gangrene aux deux jambes et au pied

Une blanchisseuse âgée de 68 ans, fort cacochime
étant bouffie et ayant les jambes enflées depuis quelque

3
tems, par une infiltration dans le tissu cellulaire); me
fit prier au mois de novembre 1759 de lui donner du
secours. je trouvai la malade avec un peu de fièvre
le pouls étoit petit, languissant et concentré: labouffure
s'étendoit par tout le corps: il y avoit déjà quelques
jours qu'elle étoit au lit, à cause disoit elle, d'une
Erysipèle qui lui affectoit les deux Jambes.

Je regardai ces jambes et je les trouvai toutes deux
attaquées de gangrene. La jambe droite étoit plus
maléficiée que l'autre; mais la mortification paroissoit
n'attaquer que la peau et le tissu cellulaire; il y
avoit du mouvement dans les muscles de cette partie

voir les
obs. de
Savièr

Dans ceux du pied et des orteils; ceux cy n'avoient
pourtant que le mouvement de flexion, l'extension
étant empêchée par la gangrene du cou-de-pied
qui paroissoit interesser les tendons extenseurs de
ces parties.

La mortification dans cette jambe, ^{s'étendoit} depuis
l'articulation des orteils (qui n'en étoient point encore
affectés) avec les os du metatarses, jusqu'à la partie
moyenne et supérieure de la jambe intérieurement.
par conséquent, le cou-de-pied, la malleole interne,
et les trois quarts de la partie interne de la jambe

en étoient atteints : le reste de la jambe, étoit fort gonflé, plat, infiltré, œdémateux, et compliqué d'inflammation érysipélateuse.

La jambe gauche qui étoit également infiltrée - œdémateuse et enflammée n'avoit qu'une tache gangreneuse de l'étendue de la paume de la main : cette tache étoit située à la partie interne et comprenoit la moitié du gras de la jambe de ce côté.

L'une et l'autre jambe avoient quelques phlyctènes dans les endroits qui n'étoient encore qu'atteints d'inflammation : et les orteils de l'un et l'autre pied étoient très rouges, ainsi que les genoux qui participoient aussi à l'inflammation. Les cuisses étoient gonflées, mais sans rougeur, leur gonflement étoit une suite ou une extension de celui qui se remarquoit dans toute l'habitude du corps.

Je tirai de cet état un pronostic assez fâcheux pour la malade ; attendu que la maladie avoit une cause interne, que les solides avoient peu de ressort ; que l'œdème étoit universel, et que la petitesse et la concentration du pouls annoncoient l'extinction prochaine de mouvement vital.

Cependant pour ne pas demeurer oisif dans un cas aussi grave, et connoissant alors les bons effets du quinquina dans la gangrene, sur le rapport de quelques observateurs dont je lisois les ouvrages: je me decidai a en faire l'essai sur ma malade, et je l'essurai que je la guerirois, si elle avoit de la confiance en moi et de la constance dans l'usage des remedes.

Comme cette maladie presentoit en meme temps plusieurs indications, également importantes a remplir je crus ne pouvoir mieux faire que d'alier au quinquina, des remedes diuretiques et hydraqgues. En consequence je fis faire une decoction d'une once de quinquina concasse, dans trois chopines d'eau mesure de paris: j'ajoutai pendant l'ebullition, une once de racine de chardon roland, et une bonne pincee de la seconde ecorce de sureau: la malade fit sa boisson ordinaire de cette espee de tisane, et la continua tous les jours, une partie du temps que dura sa maladie: le matin et le soir je faisois joindre a sa tisane une cuillerée et quelque fois deux de vin scillitique dont je donnerai la preparation a la fin de la Memoire.



6
Je fis ensuite, avec le bistoury des sections sur la peau
et le tissu cellulaire, j'emportai tous les lambeaux
gangreneux, afin de débarrasser la partie de la
charge que feroit cette masse inutile; mais je
laissai une portion d'escare attachée au vif, que je
n'osai enlever en coupant sur le vif de peur
d'occasionner une hémorragie, dont je n'avois peut
être pas été le maître; un fréquent saignement
de nez, et l'inspection d'un sang diffus et ressemblant
à de la lavure de chair, me firent naître
cette crainte. je comptai sur l'effet des topiques.
et sur celui des remèdes intérieurs.

Ces manœuvres me confirmèrent la conjecture
des tendons extenseurs des orteils du pied droit
que j'avois conjecturé, j'appris même que la
mortification s'étendait jusqu'au corps du muscle
qui leur donne naissance: j'enlevai tous les lieux
d'où j'avois tiré le morceau de peau gangrenée,
avec le baume Fioravanti; et j'enveloppai les
deux jambes avec des compresses, épaisses, trempées
dans une fomentation, faite avec l'infusion de
Kinkina et de fleurs de sureau; dans laquelle
j'avois mis de l'eau de vie Camphrée et un peu d'asel.

ammoniac. j'arrosai les parties malades quatre fois
par jour avec la fomentation chaude, et je
levai l'appareil deux fois par jour, pour examiner
ce qui se passoit.

L'usage de la boisson fit beaucoup uriner le
malade, et lui procura assez bien la liberté du
ventre, ces évacuations ne furent point contraires
aux plaies. Le sixième jour de son usage le
pouls commençoit à reprendre vigueur, ~~et~~ une
petite fièvre paroissoit se développer: et de lors
je commençai à voir que la gangrene se serroit
dans toute sa circonférence: l'enflure diminuoit
presqu'insensiblement mais l'inflammation restoit plus
si ardente: bientôt la ligne qui circonscrivoit
la gangrene tomba en suppuration: je favorisai
la chute des escars, avec des digestifs stimulans
et antiseptiques. Dix jours après l'apparition de
la ligne de séparation, toutes les portions d'escars
furent détachées; je les enlevai à plusieurs reprises,
et lorsqu'elles furent toutes emportées, la jambe droite



8
offrit une plaie d'une enorme etendue: celle de
la jambe gauche qui etoit moins considerable
marcha de front vers la detersion. Les
tendons extenseurs des orteils s'exfolierent peu a peu
de meme que la capsule articulaire du pied,
dont il se detacha quelques feuilletts, sans pourtant
donner jour a son interieur.

La suppuration fut tres abondante dans l'une
et l'autre plaie, je craignois meme qu'elle
n'empirât la malade, que j'eus soin de soutenir
par des alimens de la classe des farineux. a
mesure que la suppuration abondoit, les jambes
se degorgeoient, l'edematie diminuoit, et
l'inflammation s'anneantissoit. je continuai les
pansements et les fomentations, jusqu'a que les
plaies ^{fussent} bien detergees, et pussent donner de
nouvelle chairs; La nature ne fut point ingrate
a cet egard, elle nous donna des chairs, d'une
bonne qualite, qui avec le tems excederent
bientot le niveau de la peau: mais elles furent
reprimees par la pierre infernale, a mesure
que l'indication le requeroit. 14

Enfin je parvins à cicatrifer les plaies au bout de cinq mois, à compter du jour que je fus appelé, et la malade a été parfaitement guérie à cela près qu'elle ne recouvrera point le mouvement d'extension des orteils, dont les tendons s'étoient exfoliés, et qui n'avoient été réparés par rien d'équivalent.

Il faut remarquer qu'au bout d'un mois de l'usage de la tisane de quinquina, la malade s'en dégouta au point de ne vouloir plus faire d'usage, j'y suppléai en lui faisant prendre tous les jours douze grains d'extract de quinquina vulgairement appelé sel de Lagaraye, que je portai en, en augmentant successivement la dose jusqu'à vingt quatre grains; avec un peu de rhubarbe en poudre et un excipient convenable; mais elle usa toujours du vin scillitique matin et soir, pendant presque tout le traitement. Je continuai aussi de ^{l'extract} quinquina jusqu'au bout de la regeneration des chairs, à la fin du traitement la malade fut purgée plusieurs fois afin d'achever de depurer le sang, et de lui procurer une santé plus affermie.

Cette observation et celle que j'ai envoyée à l'Académie



19
sur le même sujet, sont assez semblables, par
rapport aux moyens dont je me suis servis pour
guérir les maladies qui en sont l'objet: j'ai ajouté
de plus dans celle cy des remèdes capables de
procurer l'issue des ferosités infiltrées dans toute
l'habitude du corps; ce que je n'ai pas fait
dans le premier cas; mais j'attribue la guérison
de la gangrene qui fait ici mon objet, à
l'usage intérieur et extérieur du quinquina
joint aux autres remèdes locaux que je ne
regarde que comme des moyens auxiliaires;
Car si j'avois négligé ce remède, pourrois-je me
flater d'avoir opéré deux cures aussi graves et
aussi compliquées? L'appauvrissement du sang
des malades, leur mauvais tempérament, la
foiblesse des organes essentiels à la vie, étoient
ils des objets qui dussent me permettre d'espérer
une guérison radicale par des moyens purement
locaux? C'est ce que je n'osai me persuader, les
exemples suivans, dans lesquels j'ai cherché pour
n'avoir employés que les remèdes, ne me
permettoient plus d'y avoir confiance.

II Observationth

Gangrene de Cause interne survenue
en meme tems en plusieurs endroits.

Un ancien officier age d'a peu pres 71 ans ayant
ete fort addonne a l'ivrognerie et ayant eu
plusieurs gonorrhées dans son jeune age, dont il
disoit avoir été bien guerri; fut attaque au mois
d'octobre 1755 d'une fièvre continue, et assez violente.
Le medecin qui le voyoit lui prescrivit deux saignées
et le traita comme l'on fait ordinairement dans
ces sortes de maladies.

Le septieme jour il survint au malade, de gros
boutons blancs et purulens, sur les avant-bras
aux environs de l'aisselle, et aux parties internes
des deux jambes: Ces boutons ou pustules qui
avoient le volume d'un gros pois, étoient ronds
et circonscrits ^{chacun} par un cercle rouge, tres enflammé
et d'environ un pouce de diametre: Ces cercles
étoient durs renitens, et faisoient sentir au
malade des douleurs tres vives.



Le Medecin crut que ces pustules étoient, la crise de la maladie, en conséquence on se hâta d'appliquer dessus des remèdes capables d'accélérer la suppuration; je perçai même quelques unes de ces pustules avec la pointe de la lancette, il en sortit un pus épais grumele et semblable à de la graisse figée; on pansa ces petites ouvertures avec des emplâtres suppuratifs; mais bien tôt on les vit s'agrandir considérablement, les cercles rouges tombèrent en gangrene, et gagnèrent en peu de jours toute la surface des avant-bras, le, environs de l'aîne, et l'intérieur des deux jambes, et toutes ces parties furent couvertes d'escars.

A mesure que la gangrene gagnait du terrain, le pouls venait faible et languissant on fut obligé de relever les forces par l'usage des potions cordiales; on continua les remèdes avec d'autant plus de confiance que le Medecin regardait ce phénomène comme l'effet d'une maladie essentielle. On appliqua ~~sur~~ les escars, les remèdes antiseptiques les plus forts

et les mieux indiqués, on fit des Scarifications —
 jusque dans le corps des muscles; le malade étoit
 presque insensible à l'impression de l'instrument tranchant,
 il sortit beaucoup de sang par les incisions; ce sang
 étoit très fluide et semblable à de la lavure de
 chairs; les digestifs antiseptiques furent continués,
 il sortit dans les pansements une suppuration putride
 qui infectoit; les fibres des muscles, se séparèrent de leur
 masse, et suivoient les bourdonnets et plumaceaux quand
 on les retiroit des plaies, comme des filets qui auroient
 été attachés par une extrémité, et qui auroient flotté
 de l'autre; l'infection étoit insupportable.



La gangrene des avant-bras gagna les bras, celle
 des environs de l'anus disséqua l'intestin rectum, qui
 y tomba aussi par la suite, et se propagea successivement
 sur les deux fesses; la substance fibreuse des muscles,
 grand fessier et de ceux des environs de l'anus, paroissoit
 écharpillée par la pouture.

Je ne connoissois pas encore l'usage du quinquina dans
 la gangrene; le médecin probablement ne le
 connoissoit pas non plus: car il ne nous vint en pensée

14
ni à l'un ni à l'autre de le prescrire au malade;
mais quand l'idée nous en seroit venue, eut-il été
bien possible que son action sur les humeurs,
eut été assez prompte et assez efficace pour l'opposer
au rapide progrès de cette gangrene qui fit
les ravages les plus affreux. Dans un si court
espace de tems? C'est ce que l'on pourroit douter
si les essais des praticiens ne parloient pas en
faveur de ce remède; mais ces essais seront toujours
des préjugés avantageux sur la vertu du quinquina
dans le cas en question, qui me feront toujours
regretter, de n'en les avoir pas connus, avant la
maladie du sujet de cette observation, lequel resta
dans l'état que je viens de désigner l'espace de
douze jours au bout duquel tems il mourut.

Ce qu'il y eut de singulier dans cette maladie
c'est qu'à la faiblesse près ^{le malade} possédoit la
connoissance la plus parfaite, et dicta ses
volontés à son nottaire.

Les remèdes locaux, qui ont été les seuls mis
en usage pour s'opposer au progrès de la
gangrene, ont été employés selon les règles

de l'art, et l'on n'a rien à se reprocher de ce côté-là; Cependant malgré leur emploi, ils ont été comme l'on voit très insuffisans, comme ils le seront toujours dans les gangrennes de cause interne, dont le vice du sang et des humeurs est sans contredit la principale.

Dans l'exemple suivant, la maladie a été en apparence moins compliquée, cependant j'ai échoué de même dans le traitement.

III observation



gangrene à la jambe de cause interne

Une femme âgée de 65 ans eut une disposition à la paralysie, dans le mois de mars 1756, de tout le côté gauche, les extrémités supérieures et inférieures de ce côté n'avoient que fort peu de mouvement; la malade se plaignoit que sa jambe, sur tout, étoit fort engourdie; cette partie ainsi que le pied étoient fort gonflés par une infiltration dans le tissu cellulaire, la cuisse étoit moins, et on n'y remarquoit qu'une

¹⁶
simple bouffissure; la pression des doigts ne
deprimoit point cette partie comme elle le
faisoit à la jambe et au pied.

Le gonflement gateux de la jambe devint si
considérable que cette partie s'enflamma: et
l'inflammation devint de nature érysipellateuse.
Quoique le mouvement de la jambe parut
depravé, le sentiment y étoit très vif: et la
malade sentoit de la douleur lorsqu'on la
touchoit pour la panser.

Cette malade avoit le poulx très foible, et
quoiqu'avec une bonne connoissance elle étoit
presque toujours assoupie, sans pour cela prendre
un vrai sommeil. Elle ne fut point saignée
on lui donna d'émétique et elle fit sa boisson
d'une simple infusion de squine. on appliqua
sur la jambe malade des fomentations faites
avec l'infusion de fleurs de sureau et leau
de vie Camphrée, qu'on renouvelloit quatre fois
par jour.

L'émétique fit beaucoup vomir la malade; mais

17

la tisane ne fit point passer les urines: ce qui
obligea d'y joindre, les racines aperitives avec
le nitre sans que cette addition fit plus d'effet,
et les fomentations quoiqu'faites avec soin et
precision, n'empêcherent pas le membre de
tomber en gangrene —

La gangrene se manifesta de la grandeur d'une
pierre de 24 sols, à la partie interne et
moyenne de la jambe: le lendemain son étendue
étoit celle d'un œuf de trois livres, et le troisième
jour elle eut celle de la paume de la main.
Je fis alors des scarifications, je détachai même
avec le bistouri la partie de la peau et du
tissu cellulaire atteints de mortification: je
portai les incisions jusques sur le vit. et je
pansa la plaie avec un digestif antiseptique
et pourtant suppuratif, afin de faire tomber
des portions d'escars qui n'avoient pu, toutes, être
enlevées: et de favoriser par la suppuration le
degorgement de la partie.



Le 4^e jour, de l'apparition de la gangrene
 je trouvai au pansement que la mortification
 étoit déjà au-delà des incisions: je n'en fis pas
 pour lors davantage, et je me contentai ~~de~~
 panser avec le digestif, et de continuer les
 fomentations. La malade étoit toujours assoupie
 et ne parloit que lorsqu'on l'agitoit: les urines
 étoient toujours supprimées, et le pouls très faible.
 On donna quelques gâteaux cordiaux pour ranimer
 les forces, on fit même des frictions sèches
 sur la cuisse avec des linges bien chauds: le
 pouls parut reprendre de la vigueur; mais la
 gangrene ne se bornoit point.

Le sixième jour il sortit de la plaie une
 humeur noirâtre extrêmement puante, qui
 me parut être de la lympe infiltrée qui
 sortoit des cellules graisseuses, non par l'action
 fistulique des vaisseaux et des fibres, mais par
 l'extrême relâchement de ces cellules, ou par le
 progrès de leur pourriture: Cette lympe

entraînoit avec elle des portions de parties de fibres pourries et decomposées, ce qui lui donnoit la couleur noire qu'on y observoit et la mauvaise odeur qui s'en exaloit. Ce jour là, la gangrene parut prendre des accroissements du côté du genou et s'étendre aussi vers le pied.

Il est à remarquer que la partie externe de la jambe n'étoit point encore affectée de gangrene, elle étoit toujours rouge et remplie de petites pustules qui donnoient à l'inflammation le caractère d'une Erysipèle miliaire.

Un de mes Confreres fut appelé en consultation le septieme jour, il fut d'avis qu'on fit l'amputation de la cuisse: et je crois que bon s'y seroit déterminé, malgré mes représentations, si la faiblesse de la malade n'avoit fait une contr'indication: mais ensuite considérant que la gangrene étoit de cause interne, nous jugeames l'un et l'autre que la mortification gagneroit le moignon après l'opération, et que la malade n'en seroit pas



²⁰ plus en sureté: il fut d'avis que les gangrènes
se faisoient de la même manière et fussent
continues.

Le 8^e jour nous nous y trouvâmes ensemble, la
gangrène avoit encore fait des progrès, le
membre avoit perdu entièrement l'usage du
mouvement et du sentiment, d'où nous inferâmes
que la gangrène avoit gagné les muscles,
nous fûmes confirmés dans cette idée en plongeant
le bistouri jusqu'à l'os; car la malade dans
cet essai, ne donna aucun signe de sensibilité
ni de mobilité dans la partie; nous ne jugeâmes
pas à propos d'étendre plus loin les scarifications,
la malade étoit mourante, ce que nous reconnûmes
à l'inspection du poulx qui étoit misérable, à
la difficulté de respirer et au froid des extrémités;
en effet elle tiroit à sa fin, puisqu'elle
mourut dans la nuit du 8 au 9.

Le sujet de cette observation a assez de ressemblance
quant au local de la gangrène, à celui de la

premiere observation de la memoire; l'œdème de la jambe, l'inflammation escarrelateuse, et les autres phenomenes, ne paroissent faire aucune disparité entr'elles; toute la difference qu'on pourroit y trouver vient de l'état paralytique dont elle cy étoit affectée: Cet état rendoit-il la maladie plus grave et moins accessible à l'action des remèdes? le quinquina auroit-il produit des effets dans le dernier cas, ^{ainsi} qu'il l'a fait dans le premier fait de pratique rapporté cy devant, s'il eut été employé de la même manière? il y a lieu de le presumer; Les remèdes locaux employés seuls, ont été comme l'on a vu insuffisants, quoiqu'on s'en soit servi, selon les loix de l'art, et leur action n'a point été soutenue par les motions cordiales dont la malade a fait usage, seuls moyens qui paroissent indiqués, et dont on ne s'est servi que parce qu'ils sont presents par la plupart



des auteurs de chirurgie, et parce que les vrais remèdes capables de reprimer le progrès de la gangrene, en corrigeant les vices du sang, ne nous étoient pas encore connus.

L'action du quinquina, en bornant la gangrene et en s'opposant à son progrès, n'auroit peut être que facilité la guérison de la partie malade sans rendre le mouvement à cette même partie qui étoit affectée de paralysie; mais c'est toujours beaucoup faire, que de revivifier une partie mourante et même déjà morte. D'un autre côté la paralysie n'eut elle ~~pas~~ pas été un obstacle à l'action du remède? C'est une question que l'expérience doit résoudre, et nous n'en n'avons pas à proposer.

Il sembleroit d'après ce qui vient d'être dit que le quinquina seroit un remède absolu dans toutes les gangrenes; si il est indispensable dans les cas exposés dans les précédentes observations.

il est aussi des cas ou le quinquina ^{est} ~~est~~
absolument inutile pour la guérison de cette
fâcheuse maladie; ces cas pourront se déduire
des observations suivantes, ~~et~~ de celles qui leur
ressembleront, qu'on trouve écrites dans les auteurs
et de celles que la pratique fournira par la
suite: Dans celles qui suivent on n'employa pas
le quinquina, et les malades guérissent par les
seuls remèdes locaux.

IV. observation

gangrene au scrotum et au testicule droit.

Le nommé Rossignol ancien postillon de monsieur
le duc de suff Agnan m'envoya chercher pendant la
nuit du 5 octobre 1756 pour me confier le soin
d'une tumeur considérable qu'il avoit au scrotum
et au testicules: je trouvai le malade dans son
lit avec une grande fièvre, le pouls étoit plein

et dur, le visage étoit enflammé, une alteration et une soif continuelle, obligeoit le malade de demander à boire à chaque instant; l'agitation, l'anxiété, l'inquiétude et le malaise, l'affectoient au point que la tête menaçoit de se prendre.

J'examinai la tumeur, elle avoit sans exagération la grosseur de la tête; la verge étoit retirée au point d'être presque effacée, ce qui faisoit (joint à la compression de l'urètre par la tumeur) que les urines ne passaient qu'avec beaucoup de difficultés. La tumeur étoit enflammée, pâteuse et fort engorgée; l'impulsion du doigt sur la surface, laissant un enfoncement, pouvoit assez que l'infiltration étoit dans le tissu cellulaire de la partie, distendu outre mesure; cela n'empêchoit pourtant pas que les parties contenues dans le scrotum, surtout du côté droit, ne fussent également très gonflées et fort enflammées.

L'engorgement se propageoit du côté droit, le long du cordon des vaisseaux spermatiques; mais

l'inflammation se bornoit à peu près au niveau de la racine de la verge; le côté gauche de la tumeur étoit moins enflammé que le droit; mais l'engorgement y étoit plus dur et plus ferme; quelques phlictaines et quelques points noirs placés à peu près dans le milieu de la tumeur, du côté droit, annonçoient une gangrène déjà confirmée; on ne sentoît point de fluctuation, en maniant la tumeur; la douleur, la chaleur, la tension et l'inflammation y étoient considérables.



Cette maladie devoit son existence, à une chute qu'avoit fait le malade, de sa hauteur, sur une quille dressée, en s'amusant de ce jeu, laquelle avoit froissé le testicule et fait une forte contusion à cette partie et à ses enveloppes.

Des l'instant de la chute, le malade sentit une douleur vive à la partie, et ne put tenir la place plus long tems: De retour chez lui, il fit venir un medecin au lieu d'un chirurgien. La

medecin le mit a l'usage du lait coupé pour toute nourriture et tout remede : il lui en fit prendre quatre a cinq cuillerées par jour, et negligea les saignées, les topiques, emolius - resolutifs qui paroissoient beaucoup mieux indiqués : l'inflammation se developpa peu à peu, l'enflure gagna, la fièvre se manifesta, et les accidens que je viens de decrire se montrerent dans toute leur force.

Il se coula trois semaines entre le tems de la blessure et celui auquel je pris possession du malade : mon premier soin fut de m'opposer aux symptomes, qui me paroissoient les plus pressans. Je saignai d'abord le malade, malgré que la gangrenne déjà confirmée me parut contr'indiquer ce remede ; je ne pus m'y refuser, a cause de la plenitude des vaisseaux, de l'intensité de la fièvre, et de la gravité des accidens, dont celui que je redoutois le plus étoit l'affection de la tête, qui commençoit déjà à se prendre. Il étoit

alors deux heures du matin.

A sept heures je resaignai le malade et je
réitérai la saignée à onze heures parce que les
symptômes n'avoient eu aucune diminution à la première
et à la seconde. Les saignées calmèrent un peu la
soif du sang, et procurèrent au malade un calme
qui n'auroit pas dû espérer sans ce secours. Je ~~les~~
mis ensuite, à l'usage d'un régime humectant, et
à celui des boissons delayantes et antiphlogistiques,
Je n'employai point le quinquina soit intérieurement
soit extérieurement, sa vertu antiseptique ne m'étant
pas encore bien connue. Je me servis à l'extérieur
de Cataplasmes faits de la manière suivante.

Je fis infuser dans une suffisante quantité d'eau
bouillante, des fleurs de Camomille, de melilot et
de sureau de chacune une poignée; je passai
l'infusion avec expression; j'y delayai des 4 farines
résolutives et je fis cuire le tout en consistance de
Cataplasme; avant de l'appliquer, je l'arrosai d'un peu
d'esprit de vin fortement Camphré, et j'en couvris la



partie tumefiée dans toute son étendue: je
renouvellai, ce cataplasme, trois fois dans la journée.
Le soir du même jour, la tache gangreneuse avoit
acquise l'étendue d'une pièce de 24 sols; l'ensemble
de la tumeur paroissoit moins enflammée, et la
douleur étoit moins forte; mais le volume étoit
toujours le même.

Le second jour la gangrene avoit l'étendue d'un
ecu de six livres, elle étoit circonscrite par un
cercle rouge très sensible; une fluctuation
sourde et profonde decelloit dans le fond de la
tumeur, du côté droit, un fluide épanché; mais
en petite quantité; les douleurs étoient alors
moins considérables, la tête étoit plus tranquille
et la fièvre étoit bien calmée.

Je crus que les circonstances favorables
exigeoient que je fisse l'opération à cette
tumeur, mais le malade avant de se déterminer
voulut que j'en conférasse de son état, avec
quelques uns de mes confrères; c'étoit aussi, les
intentions de ses parents, conséquemment l'opération

fut remise au lendemain. le reste du ²⁹ second
jour, j'appliquai sur le lieu gangrenné une
emplâtre de styrax, qui execto un peu l'aligne
circulaire dont j'ai parlé, et par dessus je mis
le Cataplasme décrit plus haut; je pansai le
malade trois fois jusqu'au soir; au dernier
pansement, j'aperçus l'escare se détacher de plus
en plus; mais en même temps je remarquai que
la collection du dépôt, dans l'intérieur du scrotum
étoit plus considérable: il y avoit indication pour
l'ouverture, mais l'opération fut remise au
lendemain ainsi que je viens de le dire.

Le troisième jour, le malade étoit tranquille,
la fièvre avoit cessé, les douleurs ne se faisoient
plus sentir, trois de mes confrères furent mandés,
à huit heures du matin, je leur proposai mon
avis, ils le reçurent et consentirent à ce que je
voulus.

Je fis une incision, avec le bistouri, de haut
en bas, sur le côté droit de la tumeur, à un
travers de doigt de la cloison du dartos, et

30
parallèlement à cette cloison. je donnai par cette
incision, une issue au pus contenu dans le
scrotum, dont la quantité fut évaluée à environ
une paillette : j'emportai ensuite avec le même
bistouri toute la partie gangrenée, et même
un lambeau du scrotum qui ne l'était pas,
afin de donner à la plaie une figure ovale.
Cela fait, j'examinai le testicule, je le trouvai
à moitié gangrené, l'autre moitié, de même
que l'épididyme, ne l'était pas : Je fus
d'abord tenté d'emporter cet organe, mais
l'engorgement du cordon des vaisseaux spermatiques
qui parvenoit se porter au delà de l'anneau,
me parut une contre-indication ; d'ailleurs
enhardi par la lecture du livre de Mr.

†
Recherch.
de chirurg.
p. 126 et
130.

Sharp † j'espérai détruire l'engorgement
du cordon, par les topiques résolutifs, et l'usage
des fondans : sur cet espoir je me contentai
d'emporter avec le bistouri, la partie gangrenée
du testicule, en coupant sur le vif, et de laisser
la partie saine, à laquelle étoit attachée

l'épididyme, peu éloigné de l'état naturel.³¹

Je mis le premier appareil selon les règles de l'art, et je ne le levai que le lendemain. A la levée, il sortit encore du pus, qui comme le premier exhalait une mauvaise odeur, ce qui me détermina à employer dans les pansements suivans, un digestif antiseptique, dont je continuai l'usage jusqu'au tems, que la matière purulente perdit sa fétidité.



Je ne touchai point au côté gauche de la tumeur, la gangrène n'y avoit fait aucun dégât, et l'opération que je venois de faire me portoit à croire qu'elle n'y viendroit pas; Cependant l'engorgement pâteux y subsistoit, ainsi que l'inflammation, qui, quoique moins considérable, que celle qui s'étoit fait voir au côté droit, n'avoit prise encore aucune terminaison.

Je continuai sur cette tumeur, l'application du cataplasme dont j'ai parlé, j'y joignis seulement la pulpe deignons de Lys et celle de racine de guimauve cuite dans l'eau, afin de le rendre plus

emolient, et je supprimai l'esprit de vin camphré dont je m'étois servi les jours précédents, parce qu'il ne me parut plus indiqué; j'appliquai le même Cataplasme sur la tumefaction du cordon spermatique du côté opéré.

Quinze jours après celui de l'opération je sentis un peu de fluctuation, dans le centre de la tumeur du côté gauche, qui me decella un foyer de matière, très profond; je vis qu'un abcès se formoit dans cette partie; je changeai de Cataplasmes, et j'en appliquai de tout à fait maturatifs; j'en continuai l'usage plusieurs jours, afin d'aggrandir de plus en plus la collection purulente, et de déterminer l'ademe pteuse à la suppuration: Lorsque l'empatement fut réduit en matière, et que la collection parut occuper tout l'intérieur du scrotum; je fis une incision tout le long de la tumeur de haut en bas, et parallèlement à la cloison du dartos, qui donna issue à

environ deux palletes, d'un pus très épais, très ³³ blanc et semblable à de la bouillie: le testicule de ce côté n'étant point altéré sinon un peu emacié par la compression du pus logé dans son enveloppe générale; je le laissai à sa place, et je pansai la playe avec un digestif stimulant, et le même qui servoit aux pansements de l'autre playe.

Si tôt que ce second dépôt fut ouvert, je cessai l'usage des cataplasmes: je substituai à celui que j'appliquois, sur le cordon engorgé du testicule droit, des petites frictions avec l'onguent mercuriel, que j'ai continuées pendant toute la cure.

La suppuration des deux playes fut abondante. Leur foyer n'avoient point de communications la cloison du dartois demeurée intacte s'y opposoit.

La détersion de ces deux playes s'étant faite en même temps, par les remèdes d'usage dans ces cas, leur guérison marcha de front: peu à peu l'engorgement du cordon diminua, et la partie



restante du testicule droit, se degonfla à vue d'œil,
 mais lorsque le testicule, eut à peu près regagné
 son état naturel, et que la regeneration des
 chairs commença à se faire, dans l'une et l'autre
 playe, et par conséquent la suppuration moins
 abondante: j'apperçus très distinctement dans la
 premiere playe, deux sortes de matieres, l'une
 étoit du vrai pus, et l'autre une liqueur
 blanche semblable à du lait: je reconnus
 que ce fluide étoit la liqueur féminale, qui
 sortoit des vaisseaux tronqués du testicule, et
 qui s'épanchoit dans la playe: pour prevenir
 une fistule qui auroit bien pu rester après
 la regeneration des chairs, et qui auroit empêché
 la guerison radicale de cette playe: J'appliquai
 sur la section du testicule, un petit plumaceau
 trempé dans l'eau vulnéraire spiritueuse, ce
 que je continuai quelques jours: en peu de tems
 la striction que cette eau operoit sur les orifices
 de ces vaisseaux, en resserrant suffisamment le
 diametre pour empêcher l'épanchement féminal

qui n'eut pas lieu davantage.

Dans la suite la regeneration des chairs se fit bien également dans les deux playes: le cordon spermatique se degonfla tout a fait, les cicatrices marcherent a grand pas, et le malade fut parfaitement gueri en cinq semaines. M^r Desport revenu de Fontainebleau pour faire l'état des chirurgiens de l'armée, a vu le malade sur la fin du traitement, et a été témoin de cette cure.

Quelques uns des consultants, crurent, que la maladie dont je viens de faire l'histoire dans cette observation, étoit l'effet d'une maladie vénérienne antécédente, parce que le malade en avoit déjà essuyés quelques unes antérieurement, et dont il avoit été guéri; mais je n'en crus rien, je regardai même la cause immédiate, dans la chute qu'il fit sur la quille dont j'ai parlé, qui étoit bien suffisante pour produire, par l'effet de la contusion que cette quille avoit occasionnée, tous les accidens dont cette blessure légère en apparence avoit été suivie, et le malade a qui il étoit important de

de ne me rien déguiser de son état, n'aurait pas été assez digne de se tromper soi-même, en cherchant à me tromper; D'ailleurs la guérison n'aurait pas été si parfaite, si le sang du malade eût été empreint du virus vénérien. D'autant plus que je n'ai employé aucun remède antivénérien, soit intérieurement soit extérieurement; si ce ne sont quelques pilules fondantes, ou entroient un peu d'aquila alba et d'éthiops mineral; mais en si petite quantité, qu'il étoit impossible d'espérer que leur usage fût suffisant, pour détruire une masse de virus, qu'on supposoit gratuitement infecter tout son sang; et quelques petites frictions locales sur l'étendue seulement, du Cordon engorgé; et ce qui achève de me confirmer dans l'opinion où j'étois alors, c'est que le malade a joui depuis ce temps, d'une santé assez parfaite, à l'exception de quelques indispositions de peu de conséquence.

37

Dans la maladie, qui fait l'objet de cette observation on ne s'est point servi du quinquina soit intérieurement soit extérieurement, et le malade ~~ne~~ n'a pas laissé de guérir; mais la cause de la gangrène étoit externe, et il n'y avoit point de vice dans le sang, qui parut la compliquer, aussi son progrès ceda-t-il promptement, aux remèdes locaux et aux opérations: si la Contusion du scrotum et des testicules avoit été traitée dans les premiers instans selon les règles de l'art, il est certain que la gangrène n'y seroit pas survenue, on a nombre d'exemples de pareilles Contusions qui ont cédé à l'usage des saignées et des topiques appropriés dans ces cas: ainsi de ce que le sang n'étoit point affecté du vice gangréneux, qui cause ou entretient ordinairement les gangrènes qu'on appelle de cause interne; il sembleroit qu'il étoit inutile d'employer intérieurement un remède antiseptique, à l'effet de détruire ce vice qui n'existoit pas, les remèdes locaux et les opérations ayant été suffisans.



Il y a bien de l'apparence que le vice ~~gangreneux~~, ou ce qui est la même chose, le vice qui ~~produit~~ la gangrene de Cause interne: est différent des autres vices qui altèrent la nature du sang et des humeurs. qui en emmanent, et qui compliquent quelques fois les maladies, qui ne cedent souvent que préalablement on n'ait détruit la complication; car j'ai vu des gangrenes compliquées de virus, céder aux remèdes locaux quoiqu'on ait pas employés en même temps les remèdes capables de teindre les virus, ni même qu'on n'ait pas fait prendre intérieurement de remèdes antiputrides, l'exemple suivant paroit en donner la preuve.

V^e observation

gangrene ala verge, Suite d'un phimosis

Le 28 octobre 1762 on me mit entre les mains un malade qui avoit un phimosis gangreneux occasionné par des chancres veneriens situés sous le

39

prepuce et sur la couronne du gland; la verge
étoit extrêmement gonflée, dans toute son étendue,
enflammée depuis son milieu, jusqu'à ses attaches
et gangrenée depuis le milieu jusqu'à son extrémité.
par conséquent, le prepuce ^{et le gland} étoient atteints de la
gangrene; mais il ne paroissoit pas, que la
mortification se fut portée plus loin que la
peau qui recouvre cette partie: les bourses
étoient gonflées et enflammées, et les testicules
durs et fort douloureux.



Cette maladie se trouvoit compliquée d'une fièvre
considérable, de dureté et de plénitude dans le
pouls et du transport au cerveau; je n'eus
rien de plus pressant à faire que de saigner
deux fois le malade pour calmer les symptômes
et de le mettre à l'usage des émulsions nitreuses, et
du sel sédatif pour les mêmes intentions. J'appliquai
ensuite sur la partie malade, et gangrenée, une
emplâtre de styrax saupoudrée de fleurs de soufre

et j'en couvris la verge dans toute son —
 étendue ; je mis sur les bourses un cataplasme
 semblable à celui que j'ai décrit dans l'observation
 précédente, et je remis l'opération, qui
 pourtant paroïssoit instante, au lendemain
 matin, à cause de quelques circonstances, qui
 n'ont aucun trait à cet observation ; mais qui
 pourtant reculerent l'opération, que j'aurais
 faite sur le champ, si j'en eus été le maître.

Le lendemain l'opération fut faite, quoique
 la gangrene n'eût point encore été bornée.
 J'emportai avec le bistouri et les ciseaux
 tout ce qui fut accessible à leur tranchant ;
 je mis à nud, par ces sections, la plus grande
 partie des corps caverneux, et je trouvais que
 la plus grande partie de la membrane
 cellulaire, qui en recouvre immédiatement la
 substance, étoit aussi affectée de mortification.
 Je pris bien garde dans cette opération, de ne

point couper sur le vif, ni d'entamer la tunique
propre des Corps Caverneux; j'aimai mieux
laisser ~~plusieurs~~ plusieurs portions d'escars attachées
au vif, que de courir les risques de blesser
ce qu'il convenoit que je respectasse; d'ailleurs
je comptois sur l'effet des topiques, pour opérer
le détachement de ces portions d'escars; que
j'abandonnai à leur action.

j'appliquai sur la plaie des plumaceaux
chargés d'un digestif fait avec la therebentine
le camphre, le baume Fioravanti et l'huile
de millepertuis; je pansai le malade deux
fois par jour. Le 2 novembre l'inflammation
de la verge, et des autres parties parut
sensiblement diminuée; les portions d'escars
commencerent à se détacher, et le 4 du même
mois; toute la gangrene fut enlevée par la
suppuration, qui depuis ce tems a été fort
abondante. Le gonflement du scrotum et des



testicules diminua peu à peu, par l'action des cataplasmes dont j'ai continué l'usage quelque temps: La fièvre et les autres ~~symptomes~~ se réduisirent par l'action des remèdes dont j'ai parlé, et tout parut annoncer un succès heureux.

Lorsque toutes les escars furent tombées, j'abandonnai le Digestif décrit ci devant, et lui en substituai un autre plus relatif à l'état de la plaie et des chairs: j'ajoutai à ce dernier, partie égale d'onguent mercuriel, et je continuai les pansements, le plus longtemps qu'il me fut possible. Sur la fin de la suppuration, c'est à dire dans le temps que la cicatrice commençoit à se former, je purgeai plusieurs fois le malade, et je lui administrai les remèdes antivenériens selon la méthode ordinaire: j'en supprime le détail

Comme n'ayant aucun trait à l'objet en question qui est la gangrene.

Le malade se trouve actuellement bien guéri à cela près qu'il a une partie de la verge recouverte de la peau et l'autre d'une cicatrice; le prepuce étant tout à fait emporté, le gland se trouve decouvert; mais le malade n'en est pas incommodé.



Quoique la première cause de cette gangrene, fut un virus vénérien, on peut cependant la regarder, comme produite immédiatement par une cause externe; En effet elle ne devoit son existence, qu'à l'étranglement de la verge et du gland par le prepuce, enflammé et tendu outre mesure, effet ordinaire des chancres placés sur le gland et sous son enveloppe. et qui caractérise la maladie qu'on appelle phimosis: si la négligence

Le malade n'avoit pas retardé le tems de —
 l'opération par une tuméfaction déplacée; le progrès
 du mal n'auroit pas été si rapide et la
 gangrene qui en fut la suite, ne fut pas
 survenue: Comme le vice local presentoit
 des indications plus urgentes que le vice —
 interieur qui en étoit la cause éloignée; je
 portai toute mes vues de ce côté, et je
 n'attaquai celui cy que lorsque j'eus
 rendu maître de la gangrene: Elle
 céda aux remèdes locaux parce que, ne
 se trouvant dans le sang du malade, aucun
 vice capable de la produire immédiatement,
 je n'eus pas besoin d'employer, intérieurement
 pour sa guérison, les remèdes antiseptiques,
 le quinquina, qui sont toujours nécessairement
 indiqués dans toutes les gangrenes produites
 immédiatement par une cause interne.

Si le petit nombre de faits de pratique étoit
suffisant pour établir, un point de doctrine
invariable, sur l'usage intérieur et extérieur du
Quinquina, que plusieurs praticiens, regardent
comme le meilleur ^{remède.} dans la gangrene et
comme un des plus puissants antiseptiques; enfin
comme une espèce de spécifique dans cette
fâcheuse maladie: on pourroit conclure —



1°. Que dans les gangrenes produites
immédiatement par une cause interne, les remèdes
cordiaux qu'on a coutume d'employer intérieurement,
exclusivement au quinquina, sont toujours
insuffisants, pour s'opposer à la putréfaction
des humeurs et au progrès du mal; que
les remèdes locaux n'y sont pas eux mêmes
employés avec plus de succès, et que les
opérations les mieux concertées, et faites dans
les temps les plus utiles, sont aussi sans fruit

46 2°. Qu'au contraire l'usage intérieur et extérieur
du Quinquina dans le même cas, en redonnant
du Corps au sang appauvri, et en ranimant
l'action fistaltique des fibres engourdies et
stupéfiées, favorise la circonscription et la
séparation des solides gangrenés, s'oppose à
la propagation de la gangrene dans les
parties voisines, en bornant la mortification
et rend par cela les opérations fructueuses.

3°. Que dans la gangrene de Cause externe
ou dans celle qui ne dépend que du vice local,
dans lequel cas le sang n'est point appauvri
et où les solides ont suffisamment de force pour
séparer la gangrene, de la partie qui n'en
est point encore attaquée, surtout lorsque cette
action est excitée et favorisée par l'application
des topiques appropriés; l'usage intérieur et
extérieur du quinquina est inutile: les remèdes
locaux et les opérations sont seuls suffisants pour
procureur purement la guérison.

Preparation du vin scillitique dont on a parle' dans la premiere observ. de ce memoire.

On prend un oignon de scille on en ote les squammes
exterieures et dessechees; on le pese et on tient compte
de son poids: Ensuite, on en fait un pâte, avec de
la pâte forte de boullanger, on le met au four
cayrés que le pain en est tiré, on ly laisse deux
heures, après ce tems on l'en retire; on rompt le
pâte, on en tire l'oignon ^{qui} est cuit parfaitement,
on le coupe par morceaux dans le plan de son
axe, et on on le met dans un vase propre,
on verse dessus autant pesant que son poids, de
vin blanc, on observe que le vin surpasse la
hauteur de l'oignon, on bouche le vase avec
un liège et un parchemin mouillé; on met le tout
en digestion auprès du feu, dans le coin de la
cheminée, au bain de sable ou au soleil en été;
et au bout de 24 heures, on peut en faire usage
la dose est depuis une cuillerée jusqu'à trois, dans un



verre de tisane apertive, matin et soir, relativement
au plus ou moins d'effet qu'il produit.

J'ai guéri avec ce remède plusieurs malades atteints
d'edemate aux cuisses aux jambes, et a plusieurs
autres parties; Je l'ai employé aussi une fois
avec succès dans un hidropisie commençante.

Il arrive quelquefois que le vin fait vomir; dans
ce cas, on en diminue la dose, ou on l'étend
dans un véhicule plus ample. /

Ce 24 décembre }
1762 }

— Par André Marrigues maître
en chirurgie avec saibles